

Mieszanka uzupełniająca dla bydła mlecznego, klaczy i ogierów oraz macior i knurów **Skład**

Zestawienie składników:

kredek pastewna, krzemionka koloidalna, owoc karruby, otręby pszenne, olej rybny, przeciwutleniacz Termox z, substancja smakowo-zapachowa.

Zawartość składników w 1 kg:

Białko ogólne - 8,8%
Tłuszcz surowy - 18,4%
Popiół surowy - 13,5%
Włókno surowe - 4,1%
Energia metaboliczna - 11,52 MJ
Wapń - 7,3%
Fosfor - 0,64%
Magnez - 0,37%

1 kg preparatu zawiera:

Jod (jodek potasu – J 68%) 100 mg
Kwasy omega 3 48 g
Nośniki do 1000 g **Wskazania**

Stosować w żywieniu bydła mlecznego, klaczy i ogierów hodowlanych oraz macior i knurów **Stosowanie i dawkowanie**

Bydło mleczne

Krowy mleczne - 250 g/sztukę/dzień przez okres 100 dni po wycieleniu.

Buhaje zarodowe - 300 g/ sztukę/dzień przez cały okres pobierania nasienia.

Można podawać jako dodatek bezpośrednio do koryta lub na stół paszowy na wyłożoną paszę objętościową, zaleca się jednak mieszać w TMR-rze.

Klaczki i ogiery hodowlane

Konie pełnej- i półkrwi: ogiery na tydzień przed rozpoczęciem i w okresie stanówki w ilości 250 g dziennie, klaczki przez okres od 30 dni przed porodem i optymalnie 12 tygodni po porodzie, ale nie krócej niż 52 dni po stwierdzeniu następnej ciąży w dawce 200 g dziennie.

Konie zimnokrwiste: odpowiednio 300 i 250 g dziennie.

Konie ras małych i kuce: odpowiednio 150 i 100 g dziennie

FATRO
FATROFERTIL PLUS

Maciory i knury

Maciory: 100 g/sztukę/dzień podawać w okresie od odsadzenia prosiąt do 3 dni po inseminacji.

Knury: 150 g/sztukę/dzień przez cały okres aktywności rozplodowej. **Przechowywanie**

W oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i światłem w temperaturze do 25°C **Okres ważności**

6 miesięcy od daty produkcji **Masa netto**

Opakowania 3 i 15 kg